



КРЕОН® УМНАЯ КАПСУЛА ДЛЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ



РАСЧЕТ ДОЗИРОВОК КРЕОН® 10 000 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ У ДЕТЕЙ¹

Ферментные препараты стандартизируются по содержанию липазы, которое измеряется в единицах. Таким образом, 10 000 ЕД, указанные на упаковке Креон® – это 10 000 единиц фермента липаза.

Дети до 1 года, масса тела	Естественное вскармливание	Искусственное вскармливание
	Доза препарата, единиц (ЕД) на одно кормление (в сутки)	
4 кг	1200 (≈ 10 000)	1800 (≈ 10 000)
7 кг	2500 (≈ 12 500)	3750 (≈ 12 000)
10 кг	3500 (≈ 17 500)	3500 (≈ 17 500)

КАК РЕБЕНКУ ПРИНИМАТЬ КРЕОН®

Капсулу Креон® можно вскрыть и поделить содержащиеся внутри частицы на несколько частей (1/2, 1/4 и т.д.). Смесь минимикросфер Креон® с пищей не подлежит хранению, ее следует принимать сразу после приготовления².



1 Капсула Креон® содержит сотни маленьких частиц – минимикросфер²



2 Для приема малышами капсулу Креон® можно вскрыть²



3 Разделить частицы Креон® на несколько равных частей (4 или 6)



4 Добавить частицы Креон® к теплой пище с кислым вкусом²

Возраст	Примерная масса тела	Доза препарата (ЕД липазы/кг в сутки)	Доза препарата из расчета 10 000 ЕД липазы в одной капсуле
1 год - 5 лет	10 - 20 кг	1000 - 1500	1/3 - 1/2 капсулы х 4 раза в день

Возраст	Примерная масса тела	Доза препарата (ЕД липазы/кг в сутки)	Доза препарата из расчета 10 000 ЕД липазы в одной капсуле
5 - 17 лет	20-50 кг	500 - 1000	1/2 - 1 капсула х 4 раза в день

Креон® 10000. Капсулы кишечнорастворимые.

МНН: панкреатин.

Регистрационный номер: П N015581/01 Креон® 10000.

Показания к применению*: заместительная терапия экзокринной (ферментной) недостаточности поджелудочной железы у детей и взрослых. Для улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией ЖКТ в случаях погрешностей в питании (употребление жирной пищи, переедание, нерегулярное питание и т.д.). Противопоказания: повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Применение при беременности и в период грудного вскармливания*: назначать препарат беременным женщинам следует с осторожностью, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Во время кормления грудью можно принимать ферменты поджелудочной железы. Способ применения и дозы*: внутрь. Дозы препарата подбирают индивидуально в зависимости от тяжести заболевания и состава диеты. Капсулы следует принимать во время или сразу после каждого приема пищи (в т.ч. легкой закуски), проглатывать целиком, не разламывать и не разжевывать, запивая достаточным количеством жидкости. При затрудненном глотании (например, у маленьких детей или пациентов пожилого возраста) капсулы осторожно вскрывают, а минимикросферы добавляют к мягкой пище, не требующей пережевывания и имеющей кислый вкус (pH < 5,5), или принимают с жидкостью, также имеющей кислый вкус (pH < 5,5). Доза для взрослых и детей при муковисцидозе зависит от массы тела*. Доза при других состояниях, сопровождающихся экзокринной недостаточностью поджелудочной железы. Доза, которая требуется пациенту вместе с основным приемом пищи, варьируется от 25000 до 80000 ЕД липазы, а во время приема легкой закуски – половина индивидуальной дозы. У детей препарат должен применяться в соответствии с назначением врача. Побочные действия*: со стороны желудочно-кишечного тракта: боль в области живота, тошнота, рвота, запор, вздутие живота, диарея. Перечень всех побочных эффектов представлен в инструкции по медицинскому применению. Передозировка: симптомы: гиперурикозурия и гиперурикемия. Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: исследования не проводились. Особые указания*: У пациентов с муковисцидозом, получавших высокие дозы препаратов панкреатина, описаны стриктуры подвздошной, слепой и толстой кишки (фиброзирующая колонопатия). Во избежание осложнений применять только после консультации с врачом. Влияние на способность к управлению автомобилем и другими механизмами: не влияет или оказывает незначительное влияние на способность к управлению автомобилем и механизмами. Условия отпуска: отпускают без рецепта.

*Полная информация по препарату представлена в инструкции по медицинскому применению

СИП от 08.11.2019 на основании ИМП Креон® 10000 от 11.05.2018

1. Бельмер С.В., Приворотский В.Ф., Рычкова С.В. с соавт. Рекомендации. Применение высокоактивных форм панкреатина в педиатрической практике. Вопросы детской диетологии, 2014, т. 12, №3, с. 65–70

2. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Креон® 10000, капсулы кишечнорастворимые, № РУ П N015581/01.

ООО "Эбботт Лэбораториз", 125171 г. Москва,
Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1,
Тел.: +7 (495) 258 42 81, www.ru.abbott, www.kreon.ru
RUS2132617-2 от 24.04.2020



Информация, представленная на сайте, предназначена для просмотра только совершеннолетними лицами. Материал разработан при поддержке компании ООО "Эбботт Лэбораториз" в целях повышения осведомленности пациентов о состоянии здоровья. Информация в материале не заменяет консультации специалиста здравоохранения. Обратитесь к лечащему врачу.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ